


Liens d'intérêts des 3 dernières années

- Indivior
- Camurus
- Recordati


2


4

1




Ce qui fait le risque addictif et médicaments anticraving versus de remplacement • Réduire le craving Ne pas avoir d'effet renforçant positif Bloquer l'effet renforçant de la substance d'addiction Longue demi-vie ou longue durée d'action • Une prise par jour Auriacombe 2003







5 6

1







Conclusion et pour discuter

- En cas de mésusage
- Ecouter les patients
- Parfois, utile de leur donner les mots pour le dire

9 10


Un modèle simplifié de l'addiction Une maladie caractérisée un signe : La rechute un symptôme marqueur diagnostic et pronostic de la rechute : Le « craving » Usage Craving c'est l'étiologie de l'usage dans l'addiction


Les addictions : critères diagnostiques reflet d'une multitude de problèmes Trouble de l'usage

• Au moins 2 sur 12 mois
1)Quantité plus importante Une multitude d'intervenants Educateurs spécialisés 2)Difficulté arrêter/contrôler 3)Temps passé Médecins 4)Craving 5)Défaillant / rôles 6)Problèmes Sociaux/Interpersonnels 7)Abandon d'activité Assistant sociaux Psychiatres Psychologues 8)Usage dangereux 9)Problèmes Psychologiques/Physiques 10)Tolérance* Neuropsychologues Infirmiers Diététiciens Pharmaciens


11 12

2





13 14



15