

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES CONCERNANT LA PRESCRIPTION DES CORRECTEURS ANTICHOLINERGIQUES AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE.

VANSTEENKISTE L¹, LORGNIER T¹, BLONDIAUX S¹, HUYNH L¹, WATTECAMPS C¹, ZAWADZKI E¹.
¹SERVICE PHARMACIE, EPSM DE L'AGGLOMÉRATION LILLOISE, SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

Introduction

Les **correcteurs anticholinergiques** sont indiqués dans les syndromes parkinsoniens induits par les antipsychotiques. Cependant ces traitements entraînent des **effets indésirables de type atropinique** et doivent être **réévalués régulièrement**.



Objectif ?

L'objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux des prescriptions des correcteurs anticholinergiques (indication, durée, antipsychotiques associés, réévaluation) dans notre établissement de santé mentale.



Matériel et méthodes

Nous avons listé, sur un jour donné, toutes les prescriptions de correcteurs anticholinergiques (tropatépine, trihexyphénidyle) au sein de notre établissement.



94 prescriptions ont été analysées à partir du dossier patient informatisé


Informations recueillies :

- Molécule dosée
- Antipsychotiques associés
- Conformité de l'indication
- Durée de prescription
- Réévaluation à J+14


Résultats

Au total nous retrouvons 94 prescriptions de correcteurs anticholinergiques :


- 64 prescriptions de tropatépine.
- 30 prescriptions de trihexyphénidyle.



Durée moyenne de prescription : 292 jours





L'indication est tracée dans 21% des prescriptions. 75% des indications tracées sont conformes à l'AMM.



Au total, sur 94 prescriptions, 6 ont été réévaluées à 14 jours post-introduction.

Ces 94 correcteurs anticholinergiques sont associés à 139 antipsychotiques dont :

- 89 antipsychotiques dits « typiques ».
- 50 antipsychotiques dits « atypiques ».



Répartition des 139 antipsychotiques associés à un correcteur anticholinergique.

Discussion - Conclusion

- Parmi les 5 antipsychotiques les plus associés à un correcteur anticholinergique, 4 sont des **antipsychotiques dits typiques** ou de première génération, **plus pourvoyeurs de syndrome parkinsonien**.
- La durée de prescription moyenne des correcteurs anticholinergiques est très élevée (**292 jours**), en lien avec un **faible nombre de réévaluation des prescriptions** (6%).
- De même, la pertinence de l'indication des correcteurs n'est pas toujours justifiée dans le DPI.
 - Une communication concernant les modalités de prescription et de réévaluation est primordiale.
 - Une alerte en cas de prescription d'un correcteur anticholinergique non réévaluée **au bout d'un mois** va être mise en place.
- Les résultats de notre enquête montrent qu'une amélioration de la réévaluation en terme de **durée de prescription** et de **l'indication** et de la **traçabilité** des prescriptions de correcteurs anticholinergiques est nécessaire au sein de notre établissement.