



ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES INFIRMIÈRES EN SERVICES DE PSYCHIATRIE AU COURS DES ÉTAPES DE PRÉPARATION ET D'ADMINISTRATION DES PSYCHOTROPES SOUS FORME BUvable

E.GAWEL, J.VALLAT, X. SEREE DE ROCH
Service pharmacie, Centre Hospitalier de Montauban (82)

Poster N°14

INTRODUCTION



**SPÉCIALITÉS
BUVABLES (Spé Buv.)**
couramment utilisées
en PSYCHIATRIE



Avantages :

Adaptation fine des posologies, observance



Inconvénients :

Risque iatrogène au cours des étapes de préparation et d'administration : erreurs de doses, préparation extemporanée, mélanges.

Certaines présentations de SB et certains Dispositifs d'Administration (Disp Adm.) constituent un **frein au bon usage**



→ Quels sont besoins et les contraintes sur le terrain à prendre en considération pour garantir le bon usage des Spé Buv. ?

OBJECTIF

Evaluer les pratiques infirmières en services de psychiatrie au cours des étapes de **préparation** et d'**administration** des **PSYCHOTROPES BUABLES**

MÉTHODOLOGIE

Diffusion d'un **AUTO-QUESTIONNAIRE** à destination des **Infirmiers Diplômés d'Etat (IDE)** des services de psychiatrie de l'établissement



RÉSULTATS

31 questionnaires complétés

- Préparation réalisée de façon **non extemporanée** par **65%** des IDE

10% Moins de 15 min **35%** Entre 15 et 30 min **55%** Plus de 30 min


- Mélanges de Spé Buv. : **61%** (jusqu'à 4 mélangées)

- Utilisation systématique du Disp Adm. fourni par le fabricant : **42%**

Motif de non utilisation du Disp Adm. fourni : **nombre important de gouttes à préparer avec un compte-gouttes (VALIUM®, CLOPIXOL®, HALDOL®)**
→ utilisation de seringue et trocard

- 93%** des IDE ont déjà été confrontés à la formation d'un précipité lors de la préparation de Spé Buv.

Unités de prescription des psychotropes en Spé Buv. à privilégier selon les IDE :



DISCUSSION

ACTIONS D'AMÉLIORATION ENVISAGÉES



Partage des réflexions au niveau institutionnel



Actions de **formation sur les bonnes pratiques** et diffusion de **supports d'information**

Considérer l'ensemble du circuit du médicament :

ACHAT

Réalisation d'**essais** sur les formes buvables dans le cadre des marchés régionaux



APPROVISIONNEMENT

Informations relatives aux **ruptures**



PRESCRIPTION

Privilégier le relais forme buvable → forme sèche



CONCLUSION

Notre étude permet de mettre en évidence la **complexité de l'utilisation en pratique des psychotropes buvables** en regard des recommandations de bon usage.

Ce travail est un bon exemple de projet de pharmacie clinique en lien avec les équipes soignantes.