


EVALUATION DE LA PRESCRIPTION DE QUETIAPINE A LIBERATION PROLONGEE DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE

LOUVRIER Marion, CHATELET Jean-Nicolas, PAUMIER Christophe, PILLIEZ Amélie, POLLET Claire
Service Pharmacie, EPSM Lille Métropole, BP 10 59487, Armentières cedex



INTRODUCTION / OBJECTIF

Le Xeroquel®, quétiapine à libération prolongée, est un antipsychotique atypique commercialisé en France depuis 2011 dans plusieurs indications : schizophrénie, troubles bipolaires (TB) (épisodes maniaques modérés à sévères, épisodes dépressifs, prévention des récurrences) et traitement adjuvant des épisodes dépressifs majeurs (EDM).

Une enquête a été mise en place au sein de notre établissement afin d'évaluer les pratiques de prescription de ce nouveau médicament.


MATERIELS ET METHODE

- Étude rétrospective à partir des ordonnances informatisées des patients (logiciel Cariatides®)
- Analyse des prescriptions de Xeroquel® initiées entre le 1er novembre 2011 et le 31 mars 2012
- Critères analysés : indication, posologie, association de traitements, âge des patients, poursuite ou arrêt du traitement sur la période

RESULTATS


91 prescriptions étudiées

1 Répartition des prescriptions en fonction des indications



49% des prescriptions de Xeroquel® sont prescrites dans la schizophrénie

3 Associations de traitements en fonction de l'indication




Xeroquel® est peu utilisé en association dans la schizophrénie (18%), mais d'avantage dans d'autres indications (trouble schizo-affectif : 67%, état maniaque TB : 46%, état dépressif TB : 70%)

Dans l'épisode dépressif majeur, il n'est utilisé en association que dans 67% des cas alors qu'il n'est indiqué qu'en traitement adjuvant

2 Répartition des posologies en fonction des indications

Rappel → Posologies recommandées :


- Schizophrénie et épisodes maniaques modérés à sévères dans les troubles bipolaires (SMR IMPORTANT ASMR V)
→ 600 mg/j (300 mg le premier jour) jusque 800 mg/j
- Episodes dépressifs dans les troubles bipolaires (SMR IMPORTANT ASMR IV)
→ 300 mg/j
- Prévention des récurrences dans les troubles bipolaires (SMR INSUFFISANT)
→ 300 à 800 mg/j
- Traitement adjuvant des épisodes dépressifs majeurs (SMR INSUFFISANT)
→ 150 à 300 mg/j




Dans la schizophrénie, le Xeroquel® est prescrit à une posologie inférieure à 600 mg/j (posologie adulte recommandée) pour 16 patients (36%)

4 Répartition des prescriptions en fonction de l'âge

Malgré les précautions d'emploi chez les sujets âgés de plus de 65 ans, cette population représente 11% des prescriptions



5 Répartition des arrêts de traitement en fonction de l'indication



Sur la période, les arrêts de traitement concernent majoritairement la schizophrénie (20 arrêts : 45%)

DISCUSSION / CONCLUSION

Dans notre établissement, le Xeroquel® est majoritairement prescrit dans la schizophrénie, mais souvent à des posologies inférieures aux recommandations (36%) et avec un important pourcentage d'arrêt (45%). Toutefois, un lien entre les faibles posologies et des éventuels arrêts par manque d'efficacité ne peut être établi. En outre, la tolérance du produit pourrait être une cause d'arrêt ou de réduction des doses. Le nombre important de prescriptions chez le sujet âgé nous a, d'autre part, amené à sensibiliser les médecins sur les posologies plus faibles à instaurer chez ces patients. Une analyse de l'évolution des prescriptions de Xeroquel® sera prochainement entreprise, le but sera d'étudier, entre autres, si l'origine des arrêts est en lien avec la tolérance et/ou le manque d'efficacité.